

Gali perdozuoti heroino, kai...

- × Esi po detoksikacijos
- × Išėjini iš kalėjimo
- × Išėjini iš ligoninės
- × Sergi
- × Nežinai narkotiko stiprumo



Perdozavimo požymiai:

- × Žmogus – be sąmonės.
- × Sunkiai kvėpuoja, šniokščia arba nebekvėpuoja visai.
- × Mėlynuoja lūpos, rankos.

Ką daryti?

- × Kviesk greitąją tel. 112.
- × Tikrink ar kvėpuoja, įsitikink, kad burnoje nėra nieko, kas trukdytų kvėpuoti.



- × Jei nekvėpuoja – užspaudus nosį 2 įpūtimai kas 5 sek.
- × Jei nėra pulso – 30 krūtinės ląstos paspaudimų, 2 įpūtimai.

ISGELBĖK GYVYBĘ. TURĖK NALOKSONO.

RESPUBLIKINIS
PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ
CENTRAS



- × Leisk naloksoną į raumenį – ranką, šlaunį, sėdmenis. Galima per rūbus.
- × Toliau palaikyk kvėpavimą. Jei kvėpavimas negrįžta po 2 min. – leisk dar naloksono.



- × Stebėk!
Vaisto poveikis trunka 30–90 min.
Perdozavimo požymiai gali pasikartoti.

Naloksonas yra heroino ir kitų opioidų priešnuodis, LAIKINAI blokuojantis gyvybei pavojingą per didelės narkotiko dozės poveikį.

Daugiau informacijos
www.rplc.lt

Dėl priklausomybės gydymo kreipkis į **Respublikinį priklausomybės ligų centrą**:



RPLC filialuose Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje,
tel. (8 5) 213 7274