

NEPAGEIDAUJAM REIŠKINIAI GALI PASIREIKŠTI SAVEIKAUJANT SU ŠIAIS VAISTAIS IR MEDŽIAGOMIS:

- **alkoholiu**
(alkoholio gali būti vaistų, losjonų, aerozolių sudėtyje);
- **priešmikrobiniais medikamentais**
(nepageidaujamas poveikis vartojant greta metronidazolą, izoniazidus);
- **antikoaguliantais**
(padidina varfarino, acenokumarolio poveikį);
- **antidepresantais**
(triciklis antidepresantas amitriptilinas sustiprina organizmo reakciją į alkoholį, padidėja triciklių antidepresantų koncentracija kraujo plazmoje);
- **prieštraukuliniais medikamentais;**
- **benzodiazepiniais**
(padidėja benzodiazepinų koncentracija kraujo plazmoje);
- **teofilinu.**



NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

RETAS:

galvos skausmas, odos bėrimas, mieguistumas, nuovargis, sumažėjęs lytinis potraukis, nemalonus skonis burnoje gali pasireikšti gydymo pradžioje. Kepenų pakenkimas (apetito stoka, pykinimas, gelta) retai pasireiškia (dažniausiai per 60 dienų).

LABAI RETAS:

periferinių nervų uždegimas, optinis neuritas, psichozė, alerginis dermatitas.



RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

MEDIKAMENTO PASKIRTIS

Disulfiramas (Esperal® ir kiti vaistai) – tai pagalbinė priklausomybės nuo alkoholio gydymo priemonė, kurią skiria specialistas (gydytojas psichiatras, šeimos gydytojas, medicinos gydytojas ir kiti).

Disulfiramas blokuoja kepenų fermento skaidančio alkoholį, aktyvumą. Pavartojus alkoholio (nors ir mažais kiekiais), organizme kaupiasi acetaldehidas. Jis sukelia pacientui nemalonią sisteminę reakciją, kuri pasireiškia veido paraudimu, galvos skausmu, širdies plakimu, pykinimu ir vėmimu.

Reakcija į alkoholį prasideda per 10 min. po alkoholio pavartojimo, ir įprastai trunka 30–60 min.,

SKYRIMO INDIKACIJOS

Rekomenduojama disulfiramą skirti pacientams su vidutine ir sunkia priklausomybe nuo alkoholio, kurie:

- sėkmingai nutraukė alkoholio vartojimą,
- nori susilaikyti nuo alkoholio.

Disulfiramas yra įjautrinantis organizmą alkoholiui vaistas. Net pavartojus mažą alkoholio dozę, disulfiramas sukelia labai nemalonius simptomus ir taip padeda siekti susilaikymo nuo alkoholio motyvuotiems ir bendradarbiaujantiems su specialistais pacientams.

! DISULFIRAMAS NEGYDO ILGALAIKIO ALKOHOLIO VARTOJIMO PASEKMIŲ ORGANIZMUI.

! DISULFIRAMAS NETAIKOMAS ALKOHOLIO SUKELTOS ABSTINENCIJOS BŪKLĖS GYDYMUI.

! DISULFIRAMAS YRA NAUDOTINAS TIK KUOMET, KAI PACIENTAS TURI NUOSTATĄ SUSILAIKYTI NUO ALKOHOLIO VARTOJIMO.

INFORMACIJA APIE VAISTĄ IR JO SKYRIMĄ

Disulfiramas yra 500 mg tabletės, supakuotos po 20.

Disulfiramą galima pradėti vartoti tik praėjus 24 val. nuo paskutinio alkoholio vartojimo.

Rekomenduojamas vaisto dozavimas gydymo pradžioje:

1–3 dienos. 1 tabletė (500 mg)

4–5 dienos. 0,5 tabletės (250 mg)

Toliau gydymas tęsiamas po 0,5 tabletės (250 mg), 0,25 tabletės (0,125 mg) arba, prireikus, skiriama 1 tabletė (500 mg).

Rekomenduojama pirmą mėnesį numatyti pakartotines konsultacijas 1 kartą per savaitę, vėliau – kartą per dvi savaites.

Rekomenduojama gydymo trukmė – 6 mėn. ir ilgiau.

Jeigu vartojant disulfiramą įvyksta atkrytis, vaisto vartojimą reikia nutraukti, tačiau organizmo reakcija į alkoholį gali reikštis iki 14 dienų po vaisto nutraukimo.

KONTRAINDIKACIJOS:

- širdies nepakankamumas
- koronarinė širdies liga
- buvę smegenų kraujotakos sutrikimai
- padidėjusio kraujospūdžio liga
- ryškūs asmenybės sutrikimai
- savižudybės rizika
- psichozė
- alkoholio vartojimas
- nėštumas
- maitinimas krūtimi
- jautrumas disulfiramui

DISULFIRAMĄ REIKIA SKIRTI ATSARGIAI, ESANT:

- inkstų nepakankamumui
- kepenų ligoms
- kvėpavimo ligoms
- cukriniam diabetui
- hipotireozei
- galvos smegenų traumoms